

27. *Ликотов Е.Ю.* Некоторые черты истории развития рельефа Западного Приохотья // Тез. докл. Всес. совещ. по проблеме геоморфологической корреляции. Тбилиси: Мецниереба, 1986. С. 193.
28. *Анродов В.А.* Диагональная речная эрозия и ее роль в формировании рельефа // Докл. АН СССР (ТАИ). Нов. сер. 1950. Т. 65. № 3. С. 427-430.

ния современного рельефа явилась устойчивая тенденция к поднятию территории, сильная дифференцированность движений и значительная тектоническая трещиноватость пород. Литологические условия характеризуются разнообразием метаморфических и магматических

ациями склоновых процессов является еще одним важным морфодинамическим фактором, влияющим на формирование россыпей.

К главным рельефообразующим процессам (вместе с экзогенными – склоновыми и флювиальными) относятся эндогенный тектонический. Главные движения по разломам и

1200 м (если судить по третьему участку). Ясно, что при наивысших темпах поднятия это сначала произошло в приосевой части Станового хребта, что косвенно подтверждается редкостью, разбросанностью и незначительными масштабами рудопроявлений на первом рудоносном участке. Большой частью они уже переработаны и уничтожены экзогенными процессами.

нальные) по отношению к направлению долин перекосы способствовали формированию россыпей долин рек Дес, Невачан, С. Ларба, Крест, Коновичи. Боковой перекося (с относительным поднятием верхнего – по своему падению – края) левой части бассейна р. С. Ларба (между устьями рек Апсакан и В. Сирик) обусловил односторонние правые горизонтальные миграции русла и следующую из

10. Отчет партии № 3/83–85 по литохимической съемке на Олекминской площади (БАМ) за 1983–85 гг. / В.В. Домчак, В.Н. Третьяков и др. Александров: 1986. 275 с.